



COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers



knmt

Si vous avez subi un traitement endodontique

1. Des douleurs sont tout à fait normales, causées par la désinfection et la douleur d'amputation (douleur fantôme).
2. En cas de douleur, vous pouvez prendre un **paracétamol** comme calmant.
3. Vous devez prendre contact avec le dentiste si :
 - vous avez encore de fortes douleurs en mangeant ou en croquant 48 heures après le traitement.
 - il y a une inflammation importante (vous aurez peut-être besoin d'une cure d'antibiotiques)

Si vous avez subi une intervention chirurgicale (extraction d'une dent ou molaire)....

1. En cas de douleur, on peut prendre du **Paracétamol**.
2. En cas de douleur, **ne pas prendre d'Aspirine**, en raison de son effet anticoagulant (danger de saignement).
3. Vous pouvez manger et boire, mais il faut que ce ne soit pas trop chaud. Le yaourt et la crème **ne sont pas** recommandés.
4. On ne doit **pas rincer** ni balayer la plaie avec la langue.
5. Pendant 2 à 3 jours, il vaut mieux mâcher les aliments du côté opposé.
6. Pour les **fumeurs**, fumer le moins possible pendant la journée.
7. **En cas de saignement, appeler le dentiste.**
Toutefois, il ne faut pas confondre ce saignement avec un goût de sang, qui est normal.