



COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers



Nadat u een endodontische behandeling heeft ondergaan....

1. Is het heel normaal dat er enige napijn optreedt door ontsmetting en amputatiepijn (fantoempijn).
2. Mag u in geval van pijn als pijnstiller een **paracetamol** innemen.
3. Moet u contact opnemen met de tandarts als:
 - u na 48 uur na de behandeling nog hevige pijscheuten heeft bij het eten of dichtbijten.
 - er een forse zwelling ontstaat (er zal dan misschien een antibioticakuur nodig zijn)

Nadat u een operatieve ingreep (kies of tand getrokken) heeft ondergaan....

1. Mag men in geval van pijn **Paracetamol** innemen.
2. Mag men in geval van pijn **geen Aspirine** innemen, omwille van het bloedverdunnend effect (gevaar voor nabloeden).
3. Eten en drinken mag, maar let op dat het niet te warm is. Eten van yoghurt/vla is **niet** aan te raden.
4. Mag men **niet** naspoelen, noch met de tong in de wond gaan.
5. Is het beter gedurende 2 tot 3 dagen het voedsel aan de tegenovergestelde zijde te kauwen.
6. Moet men als **roker** gedurende de hele dag zo min mogelijk roken.
7. **Moet men in geval van nabloeden de tandarts opnieuw raadplegen.**
Dit nabloeden mag men echter niet verwarren met een bloedsmaak, die wel normaal is.